

# Prestation du traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse, au niveau communautaire, dans le contexte de la flambée de maladie à COVID-19

Ce résumé a été élaboré pour soutenir la mise en œuvre du traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse (TPIp) au niveau communautaire en présence de la COVID-19. La section ci-dessous contient des informations importantes sur la COVID-19. Elle est suivie d'un outil de travail pour soutenir la mise en œuvre au niveau national. Le public visé est les responsables de la santé (paludisme, santé maternelle et infantile), les prestataires de soins de santé et les responsables de la mise en œuvre. Veuillez noter que la mise en œuvre du TPIp au niveau communautaire est **soumise aux directives / restrictions nationales** en vigueur mises en place pour minimiser la transmission de la COVID-19.

## Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le nouveau coronavirus découvert le plus récemment (SARS-CoV-2). Ce nouveau virus et cette nouvelle maladie étaient inconnus avant le début de l'épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019.<sup>1</sup>

## Qui sont les personnes à risque de la COVID-19 ?

**Tout le monde est à risque** d'infection par COVID-19, même si les personnes âgées et les personnes souffrant de conditions médicales préexistantes (telles que l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, le cancer ou le diabète) semblent développer une maladie grave plus souvent que les autres<sup>1</sup>.

Contrairement au virus Zika, on sait peu sur la façon dont la COVID-19 affecte les femmes enceintes et leurs bébés.<sup>2</sup> Par conséquent, **il est préférable que les femmes enceintes et leurs soignants suivent les conseils de prévention nationaux et mondiaux** fournis à l'ensemble de la population.

## Quels sont les symptômes de la COVID-19 ?

Certaines personnes sont infectées mais ne développent aucun symptôme et ne se sentent pas bien. Les symptômes les plus courants associés à la COVID-19 sont **la fièvre, la toux sèche et l'essoufflement. Ces symptômes peuvent apparaître 2 à 14 jours après l'exposition. La difficulté à respirer** est un signe de **maladie grave** pour laquelle la patiente doit consulter immédiatement un médecin<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> WHO, Q&A on coronaviruses (COVID-19). <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses>







<sup>2</sup> WHO, Q&A on COVID-19, pregnancy, childbirth and breastfeeding. <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding>

# Comment éviter d'attraper ou de transmettre la COVID-19?

## Actions preventives<sup>1</sup>

Les recommandations mondiales pour la prévention de l'infection au COVID-19 sont énumérées dans le tableau 1 ci-dessous.

**Tableau 1 : Actions préventives**


	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Lavez-vous fréquemment</b> les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. Si vous n'avez ni eau ni savon, <b>utilisez un désinfectant à base d'alcool contenant au moins 60% d'alcool</b>. Si ceux-ci ne sont pas disponibles dans le commerce, vous pouvez en créer un vous-même (voir les directives de l'OMS ci-dessous pour savoir comment frotter les mains).</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Maintenez une distance sociale</b> d'au moins 3 pieds (1 mètre). Évitez les grands rassemblements où la participation est supérieure à cinq personnes ou tel que recommandé dans vos directives nationales.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Évitez de vous toucher le visage</b> (yeux, nez, bouche), sans vous être correctement lavé les mains.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Essuyez les articles fréquemment touchés</b> (poignées de porte, interrupteurs, télécommande, appareils électroménagers, poignées, rampes d'escalier, bureaux, toilettes, robinets, éviers, etc.) avec les désinfectants recommandés tels que l'hypochlorite de sodium (par exemple, eau de javel domestique), le peroxyde d'hydrogène ou les solutions d'alcool avec au moins 70% d'alcool.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pratiquez l'étiquette de la toux ou des éternuements</b> : tousssez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir, jetez-le immédiatement dans une poubelle et lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau.</li></ul>
	<p><b>Si vous avez de la fièvre, si vous tousssez et si vous avez des difficultés respiratoires, consultez un médecin.</b> Appelez à l'avance et suivez les instructions de votre prestataire de soins de santé. Dans les pays où le gouvernement a mis en place des lignes d'assistance téléphonique ou des plateformes de communication WhatsApp, utilisez-les et partagez les informations. <b>Dites à toute personne qui a été en contact avec une personne dont le test de dépistage du virus est positif de rester à l'écart des autres en restant à la maison.</b> Restez dans une pièce ou une zone spécifique si possible, et loin des autres personnes présentes dans la maison.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Portez un masque</b> si vous présentez des symptômes de maladie ou si vous soignez une personne malade.</li></ul>



## Mesures spécifiques pour la prestation de TPIp au niveau communautaire



A mesure que la pandémie de la COVID-19 se propage en Afrique subsaharienne, elle devrait affecter la prévention du paludisme, notamment sur la prestation de TPIp au niveau communautaire. Cependant, nous devons faire tout notre possible pour **protéger les acquis de l'approche communautaire du TPIp au niveau communautaire**, en assurant la disponibilité de sulfadoxine pyriméthamine (SP) de qualité et en habilitant nos agents de santé communautaire (ASC) à continuer de distribuer en toute sécurité la SP à toutes les femmes enceintes éligibles. Nous avons également la responsabilité de les protéger contre l'acquisition et la propagation du virus.


Le projet [TIPTOP](#) implique un engagement communautaire important, notamment des **rassemblements communautaires, des visites à domicile** par les ASC ainsi que des **activités de formation et des visites de supervision** pour différents cadres d'agents de santé. A cette fin, il est important que les responsables de la mise en œuvre adaptent leurs activités pour les aligner sur les recommandations mondiales et nationales afin de prévenir la propagation de la maladie. **Bien que les mesures générales décrites ci-dessus s'appliquent à pratiquement toutes les situations, des orientations supplémentaires spécifiques à une variété d'activités menées dans le cadre de la mise en œuvre du TPIp au niveau communautaire sont décrites dans le tableau 2 ci-dessous.**

**Tableau 2 : Mesures spécifiques pour la prestation du TPIp au niveau communautaire**

	TYPE D'ACTIVITÉ	CONSEILS UTILES
1.	<p><b>Rencontres communautaires</b> avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chefs de communauté / intervenants clés</li> <li>• Membres de la communauté</li> <li>• Personnes qui fréquentent les églises ou mosquées</li> <li>• Spectateurs du théâtre de village</li> <li>• ASC</li> <li>• Participants aux groupes / comités communautaires</li> <li>• Organisations de sociétés civiles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Utiliser les tableaux à feuilles mobiles ou les affiches</b> disponibles pour informer les participants sur la COVID-19 et sa diffusion</li> <li>• <b>Mettre en œuvre les actions mondiales et / ou nationales recommandées</b> pour empêcher la propagation de la COVID-19, <b>comme indiqué ci-dessus dans les actions préventives du tableau 1.</b></li> <li>• <b>Respecter toutes les restrictions locales sur les voyages</b>, les déplacements ou les rassemblements communautaires, et en particulier les conseils sur la distanciation sociale. La <b>coopération avec les efforts de lutte contre les maladies pourra ralentir ou prévenir la propagation de la COVID-19.</b></li> </ul>
2.	<p><b>Counseling</b> aux femmes enceintes lors des visites à domicile des ASC</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lors de la préparation des visites à domicile pendant la COVID-19, les ASC doivent inclure des <b>désinfectants pour les mains à base d'alcool, des masques et des gants dans leurs sacs</b> s'ils sont disponibles pour utilisation en cas de besoins en plus des articles de routine pour le TPIp au niveau communautaire tels que la SP de qualité, les formulaires de données et les outils de travail.</li> <li>• Si quelqu'un dans un ménage semble présenter des symptômes de grippe, porter un masque et des gants pour éviter d'être infecté et garder une distance sociale de 3 pieds.</li> </ul>

	TYPE D'ACTIVITÉ	CONSEILS UTILES
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sensibiliser la femme enceinte et sa famille</b> à la pandémie de la COVID-19 et aux actions mondiales et / ou nationales recommandées pour prévenir sa propagation.</li> <li>• <b>Mettre en œuvre</b> les <b>actions</b> mondiales et / ou nationales recommandées pour prévenir la propagation de la COVID-19, comme indiqué ci-dessus <b>dans les actions préventives du tableau 1.</b></li> </ul>
3.	<p>Fourniture de SP par <b>thérapie sous observation directe (DOT)</b> aux femmes enceintes éligibles</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demander à la <b>femme enceinte éligible de se laver soigneusement les mains</b> avec de l'eau et du savon ou <b>d'utiliser un désinfectant pour les mains à base d'alcool</b> comme décrit dans le tableau 1.</li> <li>• S'assurer que la femme enceinte dispose de sa <b>propre eau potable.</b></li> <li>• <b>Poser un paquet de trois comprimés SP sur la table et demander à la femme enceinte de le prendre et de retirer les trois comprimés du papier d'aluminium.</b></li> <li>• Observer la femme enceinte avaler les comprimés de SP avec de l'eau.</li> <li>• <b>Compléter l'enregistrement</b> de l'interaction.</li> </ul>
4.	<p><b>Réunions mensuelles</b> au centre de santé ou au bureau de santé du district</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Examen mensuel des données des ASC et de réapprovisionnement avec les points focaux des établissements de santé.</li> <li>• Réunions mensuelles de validation / examen des données aux niveaux des districts et des provinces et entre les points focaux de suivi et d'évaluation des établissements de santé et des bureaux de santé du district.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Respecter toutes les restrictions locales sur les voyages</b>, les déplacements ou les rassemblements communautaires, en particulier les conseils sur la distanciation sociale.</li> <li>• <b>Mettre en œuvre les actions</b> mondiales et / ou nationales recommandées pour empêcher la propagation de la COVID-19, comme indiqué ci-dessus <b>dans les actions préventives du tableau 1.</b></li> </ul>
5.	<p><b>Evènements de formation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formation des formateurs</li> <li>• Formation des agents de santé</li> <li>• Formation des ASC</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Envisager de reporter ou d'annuler les événements de formation s'ils ne sont pas essentiels.</b> Si la formation doit avoir lieu, le nombre de participants doit être conforme aux directives nationales pour les rassemblements. Un <b>espace ouvert</b> où la distanciation sociale peut être facilement mise en œuvre est <b>préférable.</b></li> <li>• Mettre en œuvre les actions mondiales et/ou nationales recommandées pour prévenir la propagation de la COVID-19, comme indiqué dans <b>les actions préventives du tableau 1 ci-dessus.</b></li> <li>• <b>Respecter les restrictions locales pour les voyages</b>, déplacements ou rassemblements communautaires, en particulier les directives sur la distanciation sociale. <b>La coopération avec les efforts de lutte contre la maladie réduira votre risque d'attraper ou de propager la COVID-19.</b></li> </ul>

	TYPE D'ACTIVITÉ	CONSEILS UTILES
6.	<p data-bbox="298 197 607 254"><b>Soins aux patients dans l'établissement de santé</b></p> 	<p data-bbox="768 197 1344 310"><b>Les agents de santé de première ligne</b> qui interagissent avec les femmes enceintes et leurs familles ont <b>besoin de protection</b>. Il incombe au responsable de la santé de :</p> <ul data-bbox="768 317 1421 1465" style="list-style-type: none"> <li>• <b>Suivre les procédures établies en matière de sécurité et de santé au travail</b>, d'éviter d'exposer d'autres personnes à des risques pour la santé et la sécurité, et de participer à la formation en matière de sécurité et de santé au travail dispensée par l'employeur.</li> <li>• <b>Utiliser les protocoles fournis</b> pour évaluer, trier et traiter les patientes.</li> <li>• <b>Traiter les patientes avec respect, compassion et dignité</b> même si elles sont positives à la COVID-19.</li> <li>• Maintenir la <b>confidentialité des patientes</b>.</li> <li>• <b>Suivre rapidement les procédures établies de notification de santé publique</b> des cas suspects et confirmés.</li> <li>• <b>Fournir ou renforcer des informations précises sur la prévention et le contrôle des infections (PCI)</b> et la santé publique, y compris aux personnes concernées qui ne présentent ni symptômes ni risques.</li> <li>• En général, toute <b>personne effectuant le triage</b> doit avoir accès à un équipement de protection individuelle (EPI), au minimum <b>un masque médical, des gants et un tablier</b> pour la protection contre les gouttelettes.</li> <li>• <b>Mettre, utiliser, enlever et jeter correctement les EPI.</b></li> <li>• <b>Se surveiller soi-même</b> pour les signes de maladie et si la maladie survient, s'isoler et signaler la maladie aux responsables.</li> <li>• <b>Informers la direction si un agent de santé présente des signes de stress excessif</b> ou de problèmes de santé mentale qui nécessitent des interventions de soutien.</li> <li>• <b>Signaler</b> au supérieur hiérarchique immédiat toute situation susceptible de <b>présenter un danger imminent et grave pour la vie ou la santé.</b></li> </ul>
7.	<p data-bbox="298 1478 716 1535"><b>Visites de supervision facilitante intégrée</b></p> 	<ul data-bbox="768 1478 1421 1879" style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reprogrammer toutes les visites de supervision où les déplacements ont été limités.</b></li> <li>• <b>Mettre en œuvre les actions mondiales</b> et / ou nationales recommandées pour prévenir la propagation de la COVID-19, <b>comme indiqué</b> comme indiqué dans les <b>actions préventives du tableau 1 ci-dessus.</b></li> <li>• Lorsque les déplacements ne sont pas restreints : <ul data-bbox="800 1724 1421 1879" style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Effectuer la visite de supervision</b> manière à apporter un soutien et conformément aux directives nationales.</li> <li>○ <b>Faire un compte rendu à l'équipe de l'établissement de santé</b> et éduquer le personnel</li> </ul> </li> </ul>

	TYPE D'ACTIVITÉ	CONSEILS UTILES
		<p>sur la COVID-19 et sur les efforts nationaux pour la contenir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rappeler au directeur de l'établissement de santé et / ou aux agents de santé qui <b>interagissent avec les patientes</b>, qu'ils doivent <b>utiliser l'EPI si les clientes présentent des symptômes de la COVID-19</b>.</li> </ul>
8.	<p><b>Renforcement des capacités individuelles</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se tenir au courant</b> des recommandations de prévention des infections pour la pandémie de COVID-19. Vous voudrez peut-être profiter du cours de formation en ligne gratuit de l'OMS (<a href="#">WHO's free self-paced online training</a>) ou mettre à jour vos connaissances à partir de la trousse de ressources pédagogiques de Jhpiego sur la prévention et le contrôle des infections (<a href="#">Jhpiego's infection prevention and control</a>).</li> <li>• Suivre les recommandations COVID-19 de votre pays et rechercher les informations les plus récentes sur la situation dans votre région.</li> <li>• Se tenir au courant des dernières informations COVID-19 en visitant <a href="#">World Health Organization COVID-19</a>.</li> </ul>

Documents de lecture supplémentaires (hyperlien vers la source)

1. [Site Web de l'Organisation mondiale de la santé COVID-19](#)
2. [Site Web de réponse COVID-19 de Jhpiego](#)
3. [Manuel de référence de Jhpiego sur la prévention et le contrôle des infections](#)
4. [Lavage des mains avec du savon et de l'eau](#)
5. [Hygiène des mains avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool](#)
6. [Comment faire votre propre désinfectant à base d'alcool](#)
7. [Justification de l'utilisation de l'équipement de protection individuelle \(EPI\) pour la maladie à coronavirus \(COVID-19\)](#)